	Názov produktu: Folicit		
	Etiketa	Dátum: 27.03.2018	Počet strán: 1 / 2

Folicit

Obsah:

Sójový lecitín min. 700 g/kg (70 % w/w) a Slnčnicový olej max. 300 g/kg (30 % w/w)

OZNAČENIE:

Označenie nebezpečnosti: pri normálnych podmienkach použitia žiadne špecifické nebezpečenstvá.

Nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie: žiadne.

P102: Uchovávať mimo dosahu detí.

P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Výrobca: Bioka, s.r.o, Chorvátska 165, 900 81 Šenkvice, Slovenská republika

Sójový lecitín a slnečnicový olej sú schválené základné látky (EÚ No.1107 / 2009), ktoré sa môže používať pri ochrane rastlín v poľnohospodárstve.

Dátum výroby: uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale

Balenie: 100 g, 250 g, 500 g a 1 kg kelímok ; 5 a 10 kg vedro a 200 kg sud.

Skladovanie: 2 roky v originálnom obale

Ochranná doba: 0 dní

PÔSOBENIE:


Folicit je prírodný produkt zložený zo sójového lecitínu a slnečnicového oleja, ktoré aktivujú fyziologické funkcie rastlín a tým stimulujú produkciu phytoalexínov. Okrem toho Folicit vytvára nepriaznivé prostredie pre rast húb a plesní. Produkt obsahuje špeciálny sójový lecitín s vysokým obsahom prírodných fosfoglyceridov, čím plodinám napomáha vyvinúť odolnosť voči nepriaznivým účinkom spojených s napadnutia hubami. Zmierňuje účinky bunkovej nekrózy listovej čepele, ktorá je spôsobená šírením hubových vlákien (hýf) v rastlinných bunkách. Po aplikácii Folicit-u sa vytvorí ochranná vrstva, ktorá posilní bunkovú stenu rastlín a následne aktivuje obranný systém rastlín.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina alebo situácia	Kontrola škodcov	Rast, Fáza Sezóna	Počet aplikácií min./max.	Aplikačný interval (min.)	Konc. min. - max. (g/hl)	g/ha voda l/ha min. – max.	Celková aplikácia (kg/ha)
Ovocné stromy: Jablone Broskyne	Múčnatka: Podospaera leucotricha Kučeravosť broskýň Taphrina deformans	Od BBCH 03 do BBCH 79	3-12	5 dní	90	380-800 g 500-1000 l	1,2-9,0
Egreše	Múčnatka: Microspora glossulariae	Od BBCH 10 do BBCH 85	2-4	5 dní	200	1000-2000 g 500-1000 l	2,0-8,0
Zelenina: Uhorky Šalát hlávkový Valeriánka poľná	Podospaera xhantii Erysiphe polyphaga Erysiphe polyphaga	Od BBCH 10 do BBCH 89	2-6 2 1	5 dní 7 dní -	150	1500-2250 g 1000-1500 l	3,0-13,5 3,0-4,5 1,5-2,5

Bioka s.r.o.

Chorvátska 100/165, 90081 Šenkvice, Slovensko

	Názov produktu: Folicit						
	Etiketa		Dátum: 27.03.2018			Počet strán: 2 / 2	
Rajčiny	Phytophthora infestans, Oidium neolycopersici		2-6	7 dní			3,0-13,5
Čakanka štrbáková	Alternaria cichorii		2-6	7 dní			3,0-13,5
Kvety: Ruže	Múčnatka a iné hubové ochorenia	Od BBCH 10 do BBCH 89	3-12	5 dní	90	90-300 g 100-300 l	0,25-3,0
Vinič	Múčnatka viniča: Plasmopara viticola Erysiphe necator	Od BBCH 11 do BBCH 85	3-12	5 dní	90	90-300 g 100-300 l	0,25-3,0

KOMPATIBILITA: Nemiešajte s produktmi so silnou alkalickou alebo kyslou reakciou. V predstihu sa uistite, či výrobok je miešateľný pred skutočným zmiešaním.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Pri práci vonku používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky. Postrek robte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Po umytí ošetríte pokožku rúk reparačným krémom. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie vodou, hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Dôležité upozornenie! Pri požiarom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC:

Po nadýchaní: Dopravte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití: Podajte 0,5 litra vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicínalného uhlia (len v prípade, že je postihnutý pri vedomí). Postihnutého dopravte k lekárovi a ak je to možné ukážte tento obal! Nevyvolávajte zvracanie. Nepodávajte nič ústami.

Po zasiahnutí očí: Vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu 15 min. Ak sčervenanie pretrváva, zabezpečte očné vyšetrenie!

Pri zasiahnutí pokožky: Odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte teplou vodou a mydlom.

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu okamžite dopravte postihnutého k lekárovi! Informujte ho o podanej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval. V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným Informačným toxikologickým Centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

SKLADOVANIE:

Skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do +30 C. Produkt chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.